

## *Elenco farmaci controindicati*

<i>Nome</i>	<i>Forme</i>	<i>Principio</i>	<i>Controindicazioni</i>	<i>Categoria</i>
ACETILC.RATIO.	20CPR EFF600MG	ACETILCISTEINA	Ipersensibilita' ai componenti, gravidanza, allattamento. L'aspartame contenuto nelle compresse non e' indicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria.	ACETILCISTEINA
ANTEPSIN	40CPR 1G OS GRAT 20BUST 2G OS POLV 30BUST 2G OS SOSP FL 200ML 20%	SUCRALFATO	Ipersensibilita' ai componenti. Le buste contengono aspartame: non assumere in caso di fenilchetonuria. Cautela in caso di insufficienza renale, in gravidanza usare solo in caso di effettiva necessita' sotto controllo medico diretto.	ANTIULCERA
ARTROXICAM	10SUPP 20MG 30CPS 20MG CREMA 50G 1%	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenil.	ANTIREUMATICO NON STEROI
AUGMENTIN	OS 12BUST 875MG+125M 12CPR RIV 875MG+125M BB OS SOSP 12BUST BB OS SOSP FL70ML C/ BB SOSP FL35ML C/SIR	AMOXICILLINA/ACIDO CLAV	Ipersensibilita' alle penicilline e alle cefalosporine. Per la presenza di aspartame, la sospensione e' controindicata nella fenilchetonuria. Precedenti di ittero, insufficienza epatica associati al farmaco. Gravidanza, allattamento.	BETALATTAMICO - PENICILLIN
CLAVULIN	12BUST 312,5MG 12BUST 875MG+125MG 12CPR RIV 1G BB OS FL 35ML C/SIR BB OS FL 70ML C/CUCC BB OS SOSP 12BUST	AMOXICILLINA/ACIDO CLAV	Ipersensibilita' alle penicilline e alle cefalosporine. In gravidanza e nella primissima infanzia somministrare solo in caso di effettiva necessita'. Fenilchetonuria per la presenza di aspartame (limitatamente a bustine e sospensione orale bambini).	BETALATTAMICO - PENICILLIN
FLODOL	30CPS 20MG	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI

<i>Nome</i>	<i>Forme</i>	<i>Principio</i>	<i>Controindicazioni</i>	<i>Categoria</i>
FLOMAX	20CPR 700MG BB 10 SUPP OS 20BUST 350MG	MORNIFLUMATO	Ucera gastroduodenale in fase attiva, emorragie gastrointestinali in atto, ipersensibilita'all'acido acetilsalicilico e ad altri FANS. Gravidanza, allattamento, bambini di età inferiore a 6 mesi. Cautela va usata in caso di malattie emorragiche, insufficienza enale e/o epatica, affezioni del tratto superiore dell'apparato digerente. Bustine e sospensione orale contengono saccarosio: attenzione in caso di diete ipocaloriche. Le sole bustine contengono aspartame e sono controindicate nei casi di fenilchetonuria.	ANTIREUMATICO NON STEROI
FLUIMUCIL	20CPR EFF 600MG ANT.IN.TOP AD 1F 500 ANT.IN.TOP AD 3F 500 ANT.IN.TOP BB 3F 250 FIALE IM EV 10F300MG FIALE IM EV 5F 300MG MUC. OS 30BUST 100MG MUC. OS 30BUST 200MG MUC. OS GRATxSCIR FL	ACETILCISTEINA	Ipersensibilita' ai componenti, gravidanza, allattamento. L'aspartame contenuto nelle compresse non e' indicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria.	ESPETTORANTE
MESULID FAST	OS 30BUST 400MG	NIMESULIDE BETACICLODE	Ipersensibilita' individuale accertata al prodotto, all' ASA, o ad altri farmaci antiinfiammatori non steroidei. Emorragie gastrointestinali in atto o ulcera gastroduodenale in fase attiva. La formulazione in bustine contiene aspartame come dolcificante e pertanto ne e' controindicato l'uso in casi difenilchetonuria. Da usare con cautela in pazienti con anamensi di malattie emorragiche. Sconsigliato in gravidanza e allattamento. Bambini al di sotto dei 12 anni. Insufficienza epatica, insufficienza renale grave.	ANTIREUMATICO NON STEROI
MORNIFLU	20CPR 700MG BB 10 SUPP GRAT 20BUST 350MG	MORNIFLUMATO	Ucera gastroduodenale in fase attiva, emorragie gastrointestinali in atto, ipersensibilita'all'acido acetilsalicilico e ad altri FANS. Gravidanza, allattamento, bambini di età inferiore a 6 mesi. Cautela va usata in caso di malattie emorragiche, insufficienza enale e/o epatica, affezioni del tratto superiore dell'apparato digerente. Bustine e sospensione orale contengono saccarosio: attenzione in caso di diete ipocaloriche. Le sole bustine contengono aspartame e sono controindicate nei casi di fenilchetonuria.	ANTIREUMATICO NON STEROI

<i>Nome</i>	<i>Forme</i>	<i>Principio</i>	<i>Controindicazioni</i>	<i>Categoria</i>
MOTILIUM	30CPR RIV 10MG EFF GRAT 30BUST 10MG OS SOSP 200ML 1MG/ML	DOMPERIDONE	Poichè la preparazione in bustine contiene aspartame è controindicata nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Gravidanza. Bambini di età inferiore ai 12 anni. Somministrare con cautela in pazienti con insufficienza renale e/o epatica.	PROCINETICO
NIMEDEX	30BUST BIP 400MG	NIMESULIDE BETACICLODE	Ipersensibilità individuale accertata al prodotto, all' ASA, o ad altri farmaci antiinfiammatori non steroidei. Emorragie gastrointestinali in atto o ulcera gastroduodenale in fase attiva. La formulazione in bustine contiene aspartame come dolcificante e pertanto ne è controindicato l'uso in casi di fenilchetonuria. Da usare con cautela in pazienti con anamnesi di malattie emorragiche. Sconsigliato in gravidanza e allattamento. Bambini al di sotto dei 12 anni. Insufficienza epatica, insufficienza renale grave.	ANTIREUMATICO NON STEROI
PERIDON	30CPR 10MG AD 6SUPP 60MG BB 6SUPP 30MG GRAT EFF 30BUST 10MG SCIR 200ML 10MG/10ML	DOMPERIDONE	Controindicato in gravidanza e durante l'allattamento. Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze correlate dal punto di vista chimico. Non dovrebbe essere utilizzato in tutti quei casi in cui una stimolazione della motilità gastrica potrebbe risultare dannosa, come ad esempio in presenza di emorragie gastrointestinali, ostruzioni meccaniche o perforazione. Controindicato in pazienti affetti da prolattinoma. Poiché la forma in bustine contiene tra gli eccipienti aspartame, è controindicata in pazienti affetti da fenilchetonuria. Non somministrare a bambini di età inferiore ad un anno. Dovrebbe essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza epatica.	PROCINETICO
REUDENE	10SUPP 20MG	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI
RIACEN	30CPS 20MG	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI

<i>Nome</i>	<i>Forme</i>	<i>Principio</i>	<i>Controindicazioni</i>	<i>Categoria</i>
ROXENIL	30CPS 20MG CREMA 50G 1%	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI
ROXIDEN	10SUPP 20MG 30CPS 20MG GEL 50G 1% IM 6F 20MG 1ML	PIROXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI
ROZICEL	5% S.O. OS SOSP 60ML 500 6CPR 500MG	CEFPROZIL	Ipersensibilita' alle cefalosporine. Somministrare con cautela in soggetti con anamnesi di disturbi gastrointestinali (coliti). Gravidanza, allattamento, bambini al di sotto dei 6 mesi di eta'. Per la presenza di aspartame, la sospensione orale, nei due dosaggi, e' controindicata in caso di fenilchetonuria.	ALTRI BETALATTAMICI, CEFAL
SINARTROL	10SUPP 30MG 20CPR 30MG CREMA 50G 1,5%	CINNOXICAM	Nei bambini al di sotto dei 14 anni. Nei soggetti affetti da gastrite e duodenite di tipo ulceroso. Nei soggetti affetti da disturbi psichici. La formulazione in bustine, contenendo aspartame, non deve essere somministrato ai portatori di fenilchetonuria. Nei soggetti allergici all'aspirina. Da non usarsi in gravidanza e allattamento.	ANTIREUMATICO NON STEROI
SURIL 2	OS GRAT 30BUST 2G 30CPR MAST 2G	SUCRALFATO	Ipersensibilita' ai componenti. Le buste contengono aspartame: non assumere in caso di fenilchetonuria. Cautela in caso di insufficienza renale, in gravidanza usare solo in caso di effettiva necessita' sotto controllo medico diretto.	ANTIULCERA

<i>Nome</i>	<i>Forme</i>	<i>Principio</i>	<i>Controindicazioni</i>	<i>Categoria</i>
TACHIPIRINA	10MICROSUPP 125MG 10SUPP 1G 10SUPP 250MG 10SUPP 500MG 12CPR EFF DIV 1G 20CPR 500MG BB OS GTT 30ML 10% GRAT EFF20BS 125MG GRAT EFF20BS 500MG SCIR 120ML 2,4%	PARACETAMOLO	Ipersensibilita' ai componenti. Le bustine contengono aspartame: evitare l'uso in caso di fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene saccarosio: attenzione in caso di diete ipocaloriche o in caso di diabete.	ANALGESICI E ANTIPIRETTICI
VELAMOX	12CPR DISP 1G 12CPS 500MG BB OS SOSP 100ML 3,75%	AMOXICILLINA TRIIDRATO	Allergia alla penicillina e alle cefalosporine, fenilchetonuria per la presenza di aspartame, gravidanza, primissima infanzia.	BETALATTAMICO - PENICILLIN
ZOFRAN	4SUPP 16MG 6CPR 4MG 6CPR 8MG 6CPR ORODISP 4MG 6CPR ORODISP 8MG IM IV 1F 2ML 4MG IM IV 1F 4ML 8MG INIET 1FL 20ML 40MG SCIR 1FL 50ML 4MG/5ML	ONDANSETRONE CLORIDR	Gravidanza, allattamento, ostruzioni intestinali. Per la presenza di aspartame la confezione "ZYDIS" e' controindicata in caso di fenilchetonuria. L'uso delle supposte e' controindicato nei bambini.	ANTIEMETICI E ANTINAUSEA